

PAUTA DE TRABAJO PRÁCTICO EN PREDIO SANTA ROSA (UACH)

1. DESCRIPCIÓN DEL PUNTAJE PARA LA CONDICIÓN CORPORAL EN OVINOS.

El primer paso es averiguar la prominencia (agudeza o redondez) de los procesos espinosos de las vértebras lumbares (Fig. 1). El segundo es palpar el grado de cobertura y prominencia sobre los procesos transversos (Fig. 2). En tercer lugar hay que juzgar el desarrollo del tejido muscular debajo de los procesos transversos (Fig. 3) de las mismas vértebras y además averiguar lo lleno que aparece el ojo del lomo o chuleta y la cobertura de grasa lumbar en el ángulo de los procesos transversos y espinosos.

Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3



GRADOS DE CONDICIÓN CORPORAL.

PUNTAJE 0: Extremadamente emaciada y cercano a la muerte. No se detecta tejido entre la piel y el hueso.

PUNTAJE 1: Los procesos espinosos se sienten agudos y prominentes. Los procesos transversos también se notan agudos. Los dedos pasan fácilmente entre ellos y se puede sentir espacios entre cada uno. La chuleta se palpa poco profunda y sin grasa.

PUNTAJE 2: El proceso espinoso todavía se siente prominente pero redondeado, y se sienten como finamente arrugados, procesos transversos están suaves y se puede sentir los espacios con un poco de presión de los dedos. El ojo del lomo está moderadamente lleno y tiene escasa adiposidad.

PUNTAJE 3: Los procesos espinosos se detectan como pequeñas elevaciones, suaves y redondeadas y los huesos individuales se sienten sólo con bastante presión. Los procesos transversos están suaves y bien cubiertos, y debe ejercerse una presión firme para sentir los extremos. Las áreas del ojo del lomo están llenas y tienen una moderada capa de grasa.

PUNTAJE 4: Los procesos espinosos sólo pueden ser detectados con presión como una línea dura entre las áreas del lomo cubiertas con grasa. Los extremos del proceso transverso no son identificables a la palpación. Las áreas del ojo del lomo están completamente llenas y tienen una gruesa adiposidad de cobertura.

PUNTAJE 5: Los procesos espinosos no pueden ser detectados aún con mucha presión y hay una depresión entre las capas de grasa donde se sentirían normalmente al tacto. Los procesos transversos no pueden ser detectados. Las áreas del lomo están repletas y cubiertas de una espesa capa de grasa. Puede haber depósitos de grasa sobre la grupa y la cola.

2. CRONOLOGÍA DENTARIA EN OVINOS.

Los ovinos poseen una dentadura temporal y permanente como se indica:

TEMPORAL

I	C	PM	M
0	0	0	6
8	0	0	6

PERMANENTE

I	C	PM	M
0	0	6	6
8	0	6	6

(I: INCISIVOS; C: CANINOS; PM: PREMOLARES; M: MOLARES)

La dentadura además sirve para clasificar ovinos según edad, de acuerdo a la cronología siguiente:

TEMPORALES	INCISIVOS	MOLARES
Centrales	1ª semana	1º-2º-3º nacim.
1ºs medianos	2ª semana	
2ºs medianos	3ª semana	
Extremos	4ª semana	
PERMANENTES		
Centrales	12-18 meses	4º 3-5 meses
1ºs medianos	18-24 meses	5º 9-12 meses
2ºs medianos	30-36 meses	6º 18-24 meses
Extremos	36-42 meses	

REVISIÓN DE HEMBRAS: EN LA SIGUIENTE TABLA ANOTAR CONDICION CORPORAL, DIENTES Y EDAD.

	Nº OVEJA	CONDICIÓN CORPORAL	DIENTES	EDAD
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	Nº OVEJA	CONDICIÓN CORPORAL	DIENTES	EDAD
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				