

Poda de formación

- Se plantan con 2 a 3 brotes despuntados.
- Se sigue con despuntes hasta lograr 15 a 20 varas (Lcd. y Lcp.) o 15 varas (Protea)

Poda de producción

- Después de cosecha se eliminan las varas descartadas o se cortan a 10 cm
- Lcd.: los tallos débiles se dejan y se cortan a máquina en febrero (en Silvan Red se eliminan)
- Protea: se consideran 2 yemas por cargador

Protea: eliminación de brotes laterales

- *Protea compacta* y Pink Ice: a medida que aparecen
- *P. obtusifolia*: antes de la cosecha

Desbotonado en *Leucospermum*

- Se elimina el botón central para retrasar floración cuando mide 1 cm de diámetro
- En *L. erubescens* se aceptan varias flores por vara, pero en la mayoría de los cvs. se eliminan si se desarrollan

Leucadendron tipo spray

- Long Tom, Fire Glow y Blush:
Generalmente se elimina brote central

Cosecha y poscosecha

- ❖ **Hora: Protea y Lcp. sólo en la mañana**
- ❖ **Lcp.: con 40-50% flores abiertas; High Gold con 25%. Protea con brácteas empezando a abrir. Lcd. con cono formado, según mercado**
- ❖ **Flores llegan al packing en camioneta, se seleccionan por el largo, se deshojan, se hacen ramos, balde con agua y a frío (2-4°C), se embalan poco antes del transporte**
- ❖ **Ennegrecimiento de hojas en Proteas: peor en verano y en primavera. Usan Chrysal en Pink Ice; a veces eliminan las hojas negras**